

Fabienne Coroller et al., 2008

Fabienne Coroller et al., 2008

Premiers bilans de l'épizootie 2007 de FCO à sérotype 8, en France

Fabienne Coroller, Thomas Balenghien, Gina Zanella, Benoît Durand, Cédric Bouillet et Stephan Zientara

Bulletin des GTV - n°45 juillet 2008

Résumé

En 2007, l'épizootie de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) liée à l'introduction dans le Nord de l'Europe du sérotype 8 n'a pas épargné la France où 15 662 foyers ont été déclarés en 2007. Ce bilan sanitaire préliminaire révèle que plus de 80 % des foyers concernent des élevages bovins. Cependant, ce constat reflète surtout l'importance de cette filière dans le Nord-Est de la France. L'incidence de la FCO reste en effet plus forte dans les élevages ovins moins représentés dans cette zone. Le tableau clinique observé chez les ovins et les bovins révèle une grande disparité avec une intensité des symptômes très variables en fonction des élevages et du stade physiologique des animaux. L'espèce ovine a nettement plus touchée que l'espèce bovine.

Les actions de surveillance des populations de *Culicoides*

potentiellement impliquées dans la transmission de ce virus qui ont été mises en place ont révélé la constance et la prédominance des espèces du groupe *Obsoletus* dans les élevages. Face au nombre important de suspicions à gérer au fil des jours et aux exigences réglementaires imposées pour le déplacement des animaux, des mesures visant à

démultiplier les capacités de diagnostic ont de plus été prises.

[Les bulletins des GTV](#)

Oui